

Cultures

AVERTISSEMENTS

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Bulletins techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 8 du 22 Mai 2000 Rédigé en collaboration avec la Ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture

CEREALES

Ces cultures achèvent leur floraison ou sont en début de maturité.

Les maladies sont comparativement aux autres années restées peu virulentes.

La Rouille brune n'a pas connu de réelle explosion même si elle s'est "enfin" développée sur les étages supérieurs.

La Septoriose a atteint la F3.

L'Oïdium a continué son évolution sur F2 voire sur F1 pour les variétés les plus sensibles.

Ces observations s'entendent bien sûr sur nos parcelles isorisques non protégées.

Par contre les traitements réalisés selon nos divers conseils ont assuré une protection totale. Les surfaces vertes sont importantes (sauf sur les feuilles manifestant des symptômes "atypiques" déjà décrits).

La dernière application réalisée était indispensable du fait de l'évolution des maladies mais surtout compte tenu des différents épisodes pluvieux; en particulier ceux du milieu de semaine dernière intervenant sur la floraison, ont probablement engendré des contaminations en "Fusarioses".

Vis à vis de cette maladie il est toujours préférable d'être positionné légèrement en préventif.

Les pucerons commencent à monter vers les épis sur lesquels se trouvent également des chenilles de tordeuses (cnéphasia); elles consomment les épillets et donnent aussi le symptôme "épis blancs" lorsqu'elles pénètrent dans la partie supérieure de la tige.

Si vous constatez 1 épi/2 colonisé par les Pucerons vous pouvez intervenir, ce qui aura une action sur les tordeuses (et sur les zabres dans les zones concernées à l'automne) avec:

l'automne) avec:
STATUS 1 L/HA
KARATE K 1 L
BAYTHROID 0.3 L
TALSTAR 0.05 L
DECIS 0.25 L

COLZA

En ce qui concerne les insectes les traitements de protection ont dû être réalisés.

Sur quelques rares parcelles l'Oïdium a évolué vers la partie haute des plantes et commence à atteindre les siliques.

Contrôlez vos parcelles; en cas de nécessité vous pouvez intervenir, nous vous rappelons que les produits homologués sont

PUNCH CS 0.8 L/HA ERIA 2 L

POIS

Normalement ces cultures ont été protégées selon nos conseils du 05 mai (Pucerons) et du 12 Mai (Botrytis).

Dans les parcelles non traitées les Pucerons sont très nombreux dans les boutons floraux et occasionnent des dégâts importants.

Les conditions météo alternant chaleur et humidités sont favorables aux maladies.

Vous pouvez encore intervenir; reportez vous à nos précédents bulletins.

Autres cultures

Tournesol: 2 à 3 paires de feuilles; compte tenu des conditions météo du mildiou peut apparaître; n'hésitez pas à nous signaler sa présence, nous ferons des analyses pour déterminer les races présentes

Attention aux Limaces de même que pour les Sojas et les Maïs.

Sur ces dernières cultures (stades très variables, de 2 à 5 feuilles) les vers gris sont parfois bien présents, n'hésitez pas à intervenir.

Le réseau de piégeage Sésamie et Pyrale est en place; nous vous tiendrons informés de l'évolution de ces ravageurs. En ce qui concerne les maïs semences vous pourrez vous reporter à l'édition spécialisée.



CEREALES: les protections doivent être finies, la situation est saine Surveillez les ravageurs



POIS: attention aux Pucerons et risque maladies si les applications n'ont pas été réalisées



COLZA: attention à l'Oïdium



Cultures d'été: attention aux limaces (et vers gris sur maïs)

Végétaux
ZÃC D'ALCO-BP3056
34934 MONTPELLIER
CÉDEX 01
TEI: 04.67.10.19.50
Fâx: 04.67.03.10.21
Autenne Carcassonne
Céremin de la Jasso

Service Régional de la

protection des

DRAF

Afftenne Carcassonne Camin de la Jasso Pfaine Mayrevielle 17000 CARCASSONNE Tell: 04.68.71.18.58 Fax: 04.68.47.46.45

Laprimé à la station de l'Avertissements
Agricoles de Languedoc Régussillon
Darecteur gérant:
NEFREYDIER
Publication périodique
CP.P.A.P. N° 531 AD
LSSN N° 0298-6582



